

cloridrato de cinacalcete

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999

Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda

Comprimido Revestido

30 mg e 60 mg

cloridrato de cinacalcete

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos de 30 mg e 60 mg em embalagens com 30 comprimidos revestidos.

Leia toda a bula cuidadosamente antes de iniciar o uso deste medicamento.

USO ORAL

USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de 30 mg contém:

cloridrato de cinacalcete 33,06 mg (equivalente a 30 mg de cinacalcete)

Excipientes: amido, celulose microcristalina, povidona, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, opadry II Green (hipromelose, dióxido de titânio, triacetina, óxido de ferro amarelo, azul de indigotina e lactose monohidratada).

Cada comprimido revestido de 60 mg contém:

cloridrato de cinacalcete 66,12 mg (equivalente a 60 mg de cinacalcete)

Excipientes: amido, celulose microcristalina, povidona, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, opadry II Green (hipromelose, dióxido de titânio, triacetina, óxido de ferro amarelo, azul de indigotina e lactose monohidratada).

Se você tiver qualquer dúvida relacionada ao uso deste medicamento, questione seu médico ou farmacêutico.

Mantenha esta bula com o medicamento. Você pode precisar lê-la novamente.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O **cloridrato de cinacalcete** é utilizado para:

* tratar do hiperparatiroidismo

secundário em pacientes com doença grave no rim que precisam de diálise para limpar seu sangue de produtos que são normalmente excretados pelos rins.

* reduzir os altos níveis de cálcio no sangue (hipercalcemia) em pacientes com câncer de paratireóide.

* reduzir os altos níveis de cálcio no sangue (hipercalcemia) em pacientes com hiperparatiroidismo primário quando a remoção da glândula não é possível.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O **cloridrato de cinacalcete** é para ser usado por adultos com mais de 18 anos.

O **cloridrato de cinacalcete** age controlando os níveis de hormônio paratiroideano (PTH), cálcio e fósforo no seu corpo. Ele é utilizado para tratar problemas nos órgãos chamados glândulas paratiróides. As paratiróides são quatro glândulas pequenas situadas no pescoço, junto da glândula tireóide, que produzem o hormônio paratiroideano (PTH).

No hiperparatiroidismo secundário, as paratiróides produzem muito PTH. “Primário” significa que o hiperparatiroidismo não é causado por nenhuma outra condição e “secundário” significa que o hiperparatiroidismo é causado por outra condição, por exemplo, doença no rim. Tanto o hiperparatiroidismo primário quanto o secundário podem causar perda de cálcio nos ossos, que poderá levar à dor óssea e fraturas, e pode causar também problemas nos vasos sanguíneos e no coração, pedras nos rins, doença mental e coma.

Questione seu médico se você tiver qualquer dúvida sobre porque este medicamento foi prescrito para você.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você é alérgico (hipersensível) ao **cloridrato de cinacalcete** ou a qualquer um dos componentes da fórmula (veja “**COMPOSIÇÃO**”).

Este medicamento é contra-indicado para menores de 18 anos devido à insuficiência de dados de segurança e eficácia.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Converse com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar o **cloridrato de cinacalcete**.

Antes de iniciar a utilização do **cloridrato de cinacalcete**, informe ao seu médico se você tem ou já teve qualquer doença, incluindo:

- crises epiléticas (às vezes chamada de ataque ou convulsão): o risco de ter crise epilética é maior em pessoas que já tiveram história de crises anteriormente. Diminuir demasiadamente o nível de cálcio também pode aumentar o risco de crise. Se você tiver uma crise, deve comunicar ao seu médico imediatamente;
- problemas no fígado;
- insuficiência cardíaca.

Eventos que ameaçam a vida e desfechos fatais associados ao baixo nível de cálcio (hipocalcemia) têm sido relatados em pacientes tratados com **cloridrato de cinacalcete**, incluindo crianças e adolescentes.

Níveis baixos de cálcio podem afetar seu ritmo cardíaco. Enquanto fizer uso de **cloridrato de cinacalcete**, informe seu médico se você sentir batimentos incomuns no coração, rápidos ou palpitações, se você tem problemas no ritmo cardíaco, ou se você faz uso de medicamentos que conhecidamente possam causar problemas no ritmo cardíaco.

Para informações adicionais veja “**QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**”.

Durante o tratamento com **cloridrato de cinacalcete**, informe ao seu médico se você começar ou parar de fumar enquanto toma **cloridrato de cinacalcete**, pois este fato pode afetar o modo de atuação do **cloridrato de cinacalcete**.

Uso Durante a Gravidez e Amamentação - Se você está grávida, amamentando ou pretende engravidar, converse com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

O **cinacalcete** não foi testado em mulheres grávidas. Em caso de gravidez, seu médico decidirá se irá modificar seu tratamento, pois **cloridrato de cinacalcete** poderá prejudicar o feto.

Não é sabido se o **cloridrato de cinacalcete** é excretado no leite humano. O seu médico irá decidir pela interrupção da amamentação ou do tratamento com **cloridrato de cinacalcete**.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Uso em Crianças - A segurança e eficácia não foram estabelecidas em pacientes com menos de 18 anos.

O **cloridrato de cinacalcete** é indicado para utilização em adultos com mais de 18 anos.

Uso em Idosos - Não existem diferenças clinicamente relevantes na farmacocinética do **cloridrato de cinacalcete** devido à idade.

Efeitos na habilidade de dirigir e operar máquinas - Não foram conduzidos estudos sobre os efeitos de **cloridrato de cinacalcete** nas habilidades de dirigir e de operar máquinas. Foram relatadas tontura e crises epiléticas em pacientes que tomaram o **cloridrato de cinacalcete**. Caso isto aconteça com você, suas habilidades de dirigir e operar máquinas poderão ser afetadas.

Informação importante sobre alguns ingredientes do cloridrato de cinacalcete genérico- Se você possui intolerância a algum açúcar (como a lactose, por exemplo), contate seu médico antes de tomar este medicamento.

Interações com outros produtos medicamentosos - Informe seu médico ou farmacêutico sobre outros medicamentos que esteja tomando ou tomou recentemente, incluindo medicamentos obtidos sem prescrição médica.

Comunique ao seu médico se estiver tomando os medicamentos abaixo.

Medicamentos como estes podem afetar a forma de ação do **cloridrato de cinacalcete**:

- medicamentos utilizados para tratar a pele e infecções fúngicas (cetoconazol, itraconazol e voriconazol);

- medicamentos utilizados para tratar infecções bacterianas (telitromicina, rifampicina e ciprofloxacino);
- medicamentos utilizados para tratar infecções por HIV e AIDS (ritonavir); e
- medicamento utilizado para tratar depressão (fluvoxamina).

O **cloridrato de cinacalcete** pode afetar a forma de ação de medicamentos como os seguintes:

- medicamentos utilizados para tratar depressão (amitriptilina, desipramina, nortriptilina e clomipramina);
- medicamento utilizado para aliviar a tosse (dextrometorfano);
- medicamentos utilizados para tratar alterações na frequência cardíaca (flecainida e propafenona);
- medicamentos utilizados para tratar pressão sanguínea alta (metoprolol).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O **cloridrato de cinacalcete** deve ser conservado em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

A data de validade refere-se ao último dia do mês indicado.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos revestidos de **cloridrato de cinacalcete** são de cor verde-clara, ovais, gravados, de um lado “C” e do outro, a concentração do comprimido (30 ou 60).

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Dose

Hiperparatiroidismo Secundário

A dose inicial usual do cloridrato de cinacalcete é 30 mg (um comprimido revestido).

Câncer de Paratireóide ou Hiperparatiroidismo Primário

A dose inicial usual de cloridrato de cinacalcete é 30 mg (um comprimido revestido), duas vezes ao dia.

Administração - Tome o cloridrato de cinacalcete sempre de acordo com as instruções do seu médico ou farmacêutico. Seu médico dirá qual a quantidade de cloridrato de cinacalcete que você deverá tomar.

Seu médico irá colher amostras de sangue regularmente para verificar como você está respondendo ao tratamento com o cloridrato de cinacalcete e irá ajustar sua dose conforme necessário para controlar seus níveis de hormônio paratiroideano, cálcio e fosfato.

Como usar – O **cloridrato de cinacalcete** deve ser tomado por via oral, com alimento ou logo após as refeições. Os comprimidos devem ser tomados inteiros e não devem ser divididos. Uma vez que sua condição estiver sob controle, seu médico irá continuar a verificar regularmente o seu sangue e, posteriormente, sua dose poderá ser ajustada a fim de manter o controle dos níveis de hormônio paratiroideano, cálcio e fosfato a longo prazo.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome uma dose dupla se você se esqueceu de tomar a dose anterior. Se você se esquecer de tomar uma dose do **cloridrato de cinacalcete** deverá tomar a próxima dose no horário de costume.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Junto com os efeitos necessários para seu tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados.

Apesar de nem todos estes efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra.

Se você começar a sentir dormência ou formigamento ao redor da boca, dor muscular ou câimbras e convulsão, você deve comunicar ao seu médico imediatamente. Estes podem ser sinais que seus níveis de cálcio estão muito baixos (hipocalcemia).

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

- náusea e vômito, estas reações adversas são normalmente muito suaves e passageiras.

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

- tontura
- sensação de dormência ou formigamento (parestesia)
- perda ou diminuição de apetite (anorexia)
- dor muscular (mialgia)
- fraqueza (astenia)
- erupção cutânea
- redução dos níveis de testosterona
- nível elevado de potássio no sangue (hipercalcemia)
- reações alérgicas (hipersensibilidade)
- dor de cabeça
- crises epiléticas (convulsão ou ataque)
- pressão sanguínea baixa (hipotensão)
- infecção respiratória superior
- dificuldades em respirar (dispnéia)
- tosse
- indigestão (dispepsia)
- diarreia
- dor abdominal, dor abdominal – superior
- constipação
- espasmo muscular
- dor nas costas
- nível baixo de cálcio no sangue (hipocalcemia)

Frequência não conhecida:

- urticária (coceira);
- inchaço no rosto, lábios, boca, língua ou garganta que pode causar dificuldade na deglutição ou respiração (angioedema); e
- Batimentos incomuns do coração, rápidos ou palpitações, que possam estar associados com níveis baixos de cálcio no sangue (prolongamento do QT e arritmia ventricular secundária à hipocalcemia).

O **cloridrato de cinacalcete** diminui os seus níveis de cálcio. Se os níveis de cálcio se tornarem muito baixos, você pode ficar com hipocalcemia. Os sinais de hipocalcemia incluem: dormência ou formigamento ao redor da boca, dores musculares ou câimbras e convulsão. Se tiver qualquer um destes sintomas, você deve procurar seu médico imediatamente.

Após tomar o **cloridrato de cinacalcete**, um número muito pequeno de pacientes com insuficiência cardíaca apresentou piora de sua condição e/ou redução da pressão sanguínea (hipotensão).

Crianças e adolescentes - O uso do **cloridrato de cinacalcete** em crianças e adolescentes não foi estabelecido. Um desfecho fatal foi relatado em um estudo clínico com adolescente, um paciente com nível muito baixo de cálcio no sangue (hipocalcemia).

Se algum desses efeitos não desejados se tornarem sérios ou se você notar algum efeito não listado nesta bula, por favor, contate seu médico ou farmacêutico.

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe ao seu médico. Informe também a empresa através da Central de Atendimento ao Consumidor.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser usado somente na dose recomendada.

Sintomas - A superdosagem do **cloridrato de cinacalcete** pode conduzir à hipocalcemia. Os sinais de hipocalcemia incluem dormência ou formigamento ao redor da boca, dores musculares ou câimbras e crise epilética.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS 1.5143.0026

Farmacêutico Responsável:
Fabíola F. Rorato CRF-SP: 38.718

Fabricado por:
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
Survey No. 42,45 & 46, Bachupally
Village, Bachupally Mandal, Medchal
Malkajgiri District, Telangana state,
India-500090

Importado por:
Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda.
Av. Guido Caloi, 1.985 Gp.11
Jd. São Luis, São Paulo-SP
CEP: 05802-140

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800.77.07.990



carebrasil@drreddys.com

CN_1017/BL-03-PC-G

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da Petição/notificação que altera bula				Dados das alteração de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versão (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
16/03/2018	Versão atual	10452- GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/03/2018	Versão atual	10452- GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	16/03/2018	- Dizeres legais	VP/VPS	30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30
23/10/2017	2134879/17-1	10452- GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/10/2017	2134879/17-1	10452- GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	23/10/2017	- Conforme bula do medicamento referência - Dizeres legais	VP/VPS	30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10

									60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30
03/07/2017	0453032/17-2	10459 GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	03/07/2017	0453032/17-2	10459 GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	03/07/2017	Conforme bula do medicamento referência	VP/VPS	30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 30 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 14 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 28 60 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30