

**ATENÇÃO**  
**FARMACÊUTICA**  
Medicamentos  
Oncológicos Orais  
**CAPECITABINA**



**GlobalFarma**

[www.globalfarma.com.br](http://www.globalfarma.com.br)

# Orientações de Uso

## Como você deve tomar esse medicamento?

- Tome os comprimidos por via oral, pela manhã e a noite, até 30 minutos após as refeições. Ingerir os comprimidos com água!
- Os comprimidos não devem ser ingeridos com outros líquidos, além da água.
- Siga essas orientações, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

## Importante

Não parta ou mastigue os comprimidos. Caso haja necessidade de partir o comprimido por causa da dificuldade de deglutição, isso deve ser feito por um profissional treinado no manuseamento seguro de medicamentos.

## O que você deve fazer se esquecer de tomar um comprimido?

Se você esqueceu de tomar o medicamento, não tome uma dose extra. Aguarde até a dose seguinte e tome a sua dose normal.

## Como guardar seu medicamento?

Guarde-o em sua embalagem original, conservar em temperatura ambiente. Proteger da umidade. Evite a exposição ao calor, à umidade e à luz direta.

## Você pode tomar outros medicamentos durante o tratamento?

Sim, mas é preciso conversar com seu médico. Alguns medicamentos devem ser evitados por causa da interação medicamentosa: Sorivudina e seus análogos, como a brivudina. Anticoagulantes derivados da cumarina, como a varfarina. Fenitoína e outros substratos CYP2C9. Antiácidos, ácido fólico (folinato de cálcio), vacinas (vivas), metronidazol e derivados, omeprazol e outros inibidores, hidroclortiazina e diuréticos da classe, levamisol, metotrexate, tamoxiteno, tegafur e Echinacea.

## Não usar outros medicamentos, fitoterápicos ou suplementos vitamínicos sem aprovação do seu médico!

## Reações Adversas mais comuns:

Este medicamento pode provocar perda de apetite; diarreia; náusea; vômito; feridas na boca; dor na barriga; cansaço; sono profundo; anemia; febre; pressão alta; inchaço nas pernas; entupimento dos vasos sanguíneos (trombose/embolismo); dor de garganta; prisão de ventre; perda de cabelo; alteração nas unhas; dores nas juntas; dores nos músculos, braços e pernas;

febre; anemia; fraqueza; intolerância à temperatura; inchaço; dermatite; formigamento e adormecimento das extremidades das palmas e plantas dos pés (síndrome mão-pé).

## Importante

Essas Reações Adversas normalmente melhoram rapidamente em 2-3 dias. Nos casos de diarreia com mais de quatro evacuações por dia e diarreia durante a noite, de vômitos mais de uma vez em 24 horas, ou se os sintomas nas mãos e pés se agravarem com presença de dor, inchaço ou bolhas, ou ainda se a quantidade de alimentos que você ingere por dia está muito abaixo da normal e as feridas na boca se tornarem doloridas.

Antes de iniciar o tratamento é muito importante o entendimento de todos riscos e benefícios desse medicamento, por isso a importância da atenção nas orientações do profissional de saúde, na leitura desse material e do acompanhamento do profissional de saúde durante o tratamento.

Se aparecerem outras Reações Adversas, consulte o médico, farmacêutico ou enfermeiro do serviço de saúde no qual você faz tratamento.

## Atenção!

Esse medicamento pode causar infertilidade. Caso esteja planejando ter um filho, antes, converse com seu médico. Utilize sempre preservativo (camisinha ao ter relações sexuais. Pacientes mulheres devem fazer controle contraceptivo até 6 meses após o término do tratamento e pacientes homens devem fazer o controle contraceptivo até 3 meses após o término do tratamento.

- Não amamente durante o tratamento e até duas semanas após o seu término.
- Relate ao seu médico qualquer doença prévia, como: doença no rim; doença no fígado; doença no coração ou de qualquer tipo de infecção. Reações na pele durante o tratamento, podem ser graves e devem ser relatadas ao profissional de saúde responsável pelo seu tratamento.
- Pode ocorrer perda de cabelo, perda de apetite, perda de peso, diarreia moderada, constipação, náusea, vômito ou dor de estômago, apesar de serem consideradas Reações Adversas menos sérias devem ser relatadas ao seu médico.
- Lave sempre as mãos após fazer uso do medicamento.
- Procure imediatamente um médico em caso de superdose.
- Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
- Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

# CAPECITABINA

Manhã: \_\_\_\_\_ 500mg  \_\_\_\_\_ 150mg  Noite: \_\_\_\_\_ 500mg  \_\_\_\_\_ 150mg 

Dias: \_\_\_\_\_ tratamento \_\_\_\_\_ descanso

Obs: \_\_\_\_\_

Farmacêutico: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

## ANOTAÇÕES

Medicamento	Dose	Horário
		<input type="radio"/> manhã <input type="radio"/> almoço <input type="radio"/> noite

Medicamento	Dose	Horário
		<input type="radio"/> manhã <input type="radio"/> almoço <input type="radio"/> noite

Medicamento	Dose	Horário
		<input type="radio"/> manhã <input type="radio"/> almoço <input type="radio"/> noite

Medicamento	Dose	Horário
		<input type="radio"/> manhã <input type="radio"/> almoço <input type="radio"/> noite

Conheça nossos Canais de Atendimento



11 97383.9890



11 2090.4777

sac@globalfarma.com.br