

EMS SIGMA PHARMA LTDA

OLMY ANLO

20mg +5mg, 40mg + 5mg, 40mg + 10mg

comprimido revestido

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

OLMY ANLO

olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino

### APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido de 20mg/5mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100\*, 200\*\* ou 500\*\* comprimidos revestidos.

Comprimido revestido de 40mg/5mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100\*, 200\*\* ou 500\*\* comprimidos revestidos.

Comprimido revestido de 40mg/10mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100\*, 200\*\* ou 500\*\* comprimidos revestidos.

\*Embalagem fracionável

\*\*Embalagem hospitalar

### USO ORAL

### USO ADULTO

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de OLMY ANLO 20 mg/5 mg contém:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| olmesartana medoxomila.....                    | 20 mg                  |
| anlodipino* (como besilato de anlodipino)..... | 5 mg                   |
| excipiente** q.s.p. ....                       | 1 comprimido revestido |

\*equivalente a 6,934mg de besilato de anlodipino

\*\*celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco.

Cada comprimido revestido de OLMY ANLO 40 mg/5 mg contém:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| olmesartana medoxomila.....                    | 40 mg                  |
| anlodipino* (como besilato de anlodipino)..... | 5 mg                   |
| excipiente** q.s.p. ....                       | 1 comprimido revestido |

\*equivalente a 6,934mg de besilato de anlodipino

\*celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco, óxido de ferro amarelo.

Cada comprimido revestido de OLMY ANLO 40 mg/10 mg contém:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| olmesartana medoxomila.....                    | 40 mg                  |
| anlodipino* (como besilato de anlodipino)..... | 10 mg                  |
| excipiente** q.s.p. ....                       | 1 comprimido revestido |

\*equivalente a 13,868mg de besilato de anlodipino

\*celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmelose sódica, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio, álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho.

## II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?** OLMY ANLO é indicado para o tratamento da pressão arterial alta, ou seja, a pressão cujas medidas estejam acima de 140 mm Hg (pressão “alta” ou sistólica) ou 90 mm Hg (pressão “baixa” ou diastólica). Pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros agentes antihipertensivos.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?** OLMY ANLO, a associação de olmesartana medoxomila e besilato de anlodipino, age diminuindo a pressão arterial, que é a pressão com que o coração faz o sangue circular por dentro das artérias, pois provoca dilatação dos vasos sanguíneos.

O besilato de anlodipino tem sua ação iniciada entre 24 e 96 horas e a olmesartana medoxomila em uma semana após o início do tratamento.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** Você não deve usar OLMY ANLO se for sensível ou alérgico a qualquer componente deste produto ou a outros medicamentos da mesma classe do anlodipino (diidropiridinas) e durante a gravidez. Você não deve usar esse produto se é diabético e está utilizando alisquireno.

Primeiro trimestre de gestação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Segundo e terceiro trimestres de gestação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?** Durante o uso do medicamento alguns cuidados devem ser tomados como os descritos a seguir:

Queda repentina da pressão: no começo do tratamento com OLMY ANLO deve-se ter atenção quanto ao risco de tontura. Se isso acontecer, deve-se informar ao médico.

Mau funcionamento do coração: em geral, os medicamentos que contêm substâncias como o anlodipino, um dos componentes do OLMY ANLO, devem ser usados com cuidado por pessoas com mau funcionamento do coração (insuficiência cardíaca). Além disso, raramente, pessoas com outra alteração no coração (doença arterial coronariana obstrutiva grave) podem apresentar aumento de frequência, duração e/ou gravidade de angina ou infarto com o uso desse tipo de medicamento.

Mau funcionamento dos rins: pessoas com mau funcionamento dos rins podem apresentar alterações na função renal quando tratadas com OLMY ANLO.

Deficiência do fígado: OLMY ANLO deve ser usado com cuidado por pessoas com deficiência do fígado (insuficiência hepática) leve a moderada e não deve ser usado em pacientes com deficiência grave do fígado.

Pacientes utilizando sequestradores de ácidos biliares: a dose de OLMY ANLO deve ser tomada preferencialmente 4 horas antes da dose do sequestrador de ácidos biliares. Pacientes utilizando antiinflamatórios não esteroidais: o uso desses medicamentos junto com OLMY ANLO pode levar à piora da função dos rins. O efeito de OLMY ANLO pode ser reduzido pelo uso concomitante de antiinflamatórios.

Informe o seu médico se você faz uso de outros medicamentos para reduzir a pressão, lítio ou alisquireno. Pacientes utilizando esses medicamentos podem necessitar de um monitoramento terapêutico mais próximo.

Anlodipino se mostrou passar para o leite materno em pequenas quantidades. O medicamento não deve ser usado durante a amamentação sem orientação médica. Ingestão de OLMY ANLO junto com outras substâncias: em geral, OLMY ANLO pode ser tomado com alimentos ou junto com outros medicamentos. A alimentação não influencia na ação do medicamento.

Outros medicamentos: cetoconazol, itraconazol, rifampicina, ritonavir, alguns anticonvulsivantes (por exemplo: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona) e Erva de São João (*Hypericum perforatum*) podem influenciar a ação do componente anlodipino de OLMY ANLO aumentando ou diminuindo sua concentração sanguínea. Em função disso, recomenda-se monitoramento médico caso OLMY ANLO seja administrado junto com esses medicamentos.

Sinvastatina: A co-administração de doses múltiplas de 10 mg de anlodipino com 80 mg de sinvastatina resultou em aumento de 77% na exposição à sinvastatina comparada com a sinvastatina isolada. Limitar a dose diária de sinvastatina a 20mg em pacientes em uso de anlodipino.

Tacrolimo: A co-administração de anlodipino com tacrolimo pode aumentar a exposição de tacrolimo. Como OLMY ANLO contém anlodipino, o nível de tacrolimo no sangue deve ser monitorado durante o uso concomitante de anlodipino.

Ciclosporina: Em um estudo prospectivo realizado em pacientes que passaram por transplantes renais, foi observado um aumento de 40 % nos níveis de ciclosporina na presença de anlodipino. A co-administração de anlodipino com ciclosporina deve aumentar a exposição de ciclosporina. Como OLMY ANLO contém anlodipino, o nível de ciclosporina no sangue deve ser monitorado durante o uso concomitante de anlodipino.

Alterações em exames laboratoriais: podem ocorrer alterações no hemograma.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Características do produto:**

OLMY ANLO 20mg/5mg: comprimido liso, na cor branca, circular e biconvexo.

OLMY ANLO 40mg/5mg: comprimido liso, na cor amarelo claro, circular e biconvexo.

OLMY ANLO 40mg/10mg: comprimido liso, na cor vermelho escuro, circular e biconvexo.

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?** O comprimido deve ser engolido inteiro, com água potável, uma vez ao dia. Não é recomendada a administração de mais de um comprimido ao dia. Para pacientes que necessitam de redução adicional da pressão arterial, a dose pode ser aumentada em intervalos de duas semanas até a dose máxima de 40 mg/10 mg.

Pessoas com doença nos rins: não é necessário ajustar a dose inicial.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?** Caso você se esqueça de tomar OLMY ANLO, poderá tomar o comprimido esquecido ao longo do dia. Se já estiver perto do horário da próxima tomada, deverá simplesmente continuar a administração no mesmo horário de costume, sem tomar dois comprimidos para compensar aquele que foi esquecido.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?** Em estudos clínicos, a incidência de eventos adversos foi semelhante à do placebo, e a maioria dos eventos adversos foram leves. A seguir são relatados os eventos adversos observados nesses estudos:

Os eventos adversos mais frequentes foram dor de cabeça, tontura, cansaço e inchaço (edema). Os eventos adversos menos comuns incluíram queda de pressão (hipotensão), erupções cutâneas e vermelhidão na pele, palpitação e aumento da frequência urinária.

Nos estudos clínicos com anlodipino, os eventos adversos relatados foram tontura, dor de cabeça, edema, palpitação e vermelhidão na face; e nos estudos com olmesartana medoxomila relatou-se tontura.

Após a comercialização das substâncias isoladas, foram relatadas as seguintes reações adversas:

Anlodipino

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): icterícia, aumento das enzimas hepáticas e aumento das mamas.

Olmesartana medoxomila

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, tosse, insuficiência renal aguda, vermelhidão da pele e erupções cutâneas, inchaço do rosto, inchaço das pernas, dor de cabeça, alterações em exames laboratoriais (aumento dos níveis de creatinina e enzimas do fígado), dores musculares, fraqueza, cansaço, apatia, indisposição e reação anafilática.

Caso você apresente diarreia forte e duradoura que leve a perda de peso consulte imediatamente seu médico para reavaliar a continuação do tratamento.

O uso de OLMY ANLO pode, raramente, causar aumento dos níveis de potássio no sangue.

Procure o médico para avaliação da necessidade de monitoramento dos níveis sanguíneos.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?** O uso de uma quantidade maior que a indicada poderá causar hipotensão (diminuição da pressão arterial) provocando uma sensação de fraqueza e possivelmente tontura e escurecimento da vista e possivelmente taquicardia (aumento dos batimentos do coração) devido ao componente besilato de anlodipino. Nesse caso, a pessoa deverá permanecer em repouso, sentada ou deitada, e procurar auxílio médico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III - DIZERES LEGAIS**

Registro M.S. nº. 1.3569.0674

Farm. Resp.: Dr Adriano Pinheiro Coelho

CRF - SP nº 22.883

Registrado por: **EMS Sigma Pharma Ltda**

Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/nº, Km 08

Chácara Assay – Hortolândia - SP - CEP 13186-901

CNPJ: 00.923.140/0001-31

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Fabricado e Comercializado por: **EMS S/A**  
Hortolândia/ SP

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

SAC: 0800-0191914

[www.ems.com.br](http://www.ems.com.br)



### Histórico de alteração para a bula

| Dados da submissão eletrônica |                |                                                                                                | Dados da petição/notificação que altera bula |                |         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Nº. expediente | Assunto                                                                                        | Data do expediente                           | Nº. expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                      | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                                                 |
| 01/08/2016                    | 2134729/16-8   | 10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12                                | N/A                                          | N/A            | N/A     | N/A               | Disponibilização da bula no bulário eletrônico                                                                                                     | VP/VPS           | Comprimido revestido de 20mg/5mg, 40mg/5mg e 40mg/10mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100*, 200** ou 500** comprimidos revestidos |
| 05/10/2016                    | 2358302/16-9   | 10450 - SIMILAR – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                        | N/A                                          | N/A            | N/A     | N/A               | Dizeres Legais                                                                                                                                     | VP/VPS           | Comprimido revestido de 20mg/5mg, 40mg/5mg e 40mg/10mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100*, 200** ou 500** comprimidos revestidos |
| 14/10/2016                    | 2387497/16-0   | 10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação a intercambialidade | N/A                                          | N/A            | N/A     | N/A               | I – IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO                                                                                                                   | VP/VPS           | Comprimido revestido de 20mg/5mg, 40mg/5mg e 40mg/10mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100*, 200** ou 500** comprimidos revestidos |
| 23/11/2018                    | 1110489/18-9   | 10450 – SIMILAR– Notificação de alteração de Texto de Bula – RDC 60/12                         | N/A                                          | N/A            | N/A     | N/A               | VP<br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br>8. QUAIS OS MALES | VP/VPS           | Comprimido revestido de 20mg/5mg, 40mg/5mg e 40mg/10mg. Embalagens contendo 10, 15,30, 40, 60, 100*, 200** ou 500** comprimidos revestidos |

|            |              |                                                                                 |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                 |     |     |     |     | <p>QUE ESTE<br/>MEDICAMENTO PODE<br/>ME CAUSAR?<br/>III – DIZERES LEGAIS</p> <p>VPS<br/>5. ADVERTÊNCIAS E<br/>PRECAUÇÕES<br/>6. INTERAÇÕES<br/>MEDICAMENTOSAS<br/>7. CUIDADOS DE<br/>ARMAZENAMENTO DO<br/>MEDICAMENTO<br/>III – DIZERES LEGAIS</p>                                                                           |        |                                                                                                                                                           |
| 20/01/2020 | 0192158/20-4 | 10450 – SIMILAR–<br>Notificação de<br>alteração de Texto de<br>Bula – RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | <p>VPS<br/>9. REAÇÕES<br/>ADVERSAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VPS    | Comprimido revestido de<br>20mg/5mg, 40mg/5mg e<br>40mg/10mg. Embalagens<br>contendo 10, 15,30, 40, 60,<br>100*, 200** ou 500**<br>comprimidos revestidos |
| 01/09/2020 | N/A          | 10450 – SIMILAR–<br>Notificação de<br>alteração de Texto de<br>Bula – RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | <p>VP<br/>8. QUAIS OS MALES<br/>QUE ESTE<br/>MEDICAMENTO PODE<br/>ME CAUSAR?<br/>III – DIZERES LEGAIS</p> <p>VPS<br/>3. CARACTERÍSTICAS<br/>FARMACOLÓGICAS<br/>4.<br/>CONTRAINDICAÇÕES<br/>5. ADVERTÊNCIAS E<br/>PRECAUÇÕES<br/>6. INTERAÇÕES<br/>MEDICAMENTOSAS<br/>7. CUIDADOS DE<br/>ARMAZENAMENTO DO<br/>MEDICAMENTO</p> | VP/VPS | Comprimido revestido de<br>20mg/5mg, 40mg/5mg e<br>40mg/10mg. Embalagens<br>contendo 10, 15,30, 40, 60,<br>100*, 200** ou 500**<br>comprimidos revestidos |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 8. POSOLOGIA E MODO<br>DE USAR<br>9. REAÇÕES<br>ADVERSAS<br>10. SUPERDOSE<br>III – DIZERES LEGAIS |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|